

Plaie complexe de la main

lésion osseuse
lésion vaculo-nerveuse
lésion musculo-tendineuse
lésion cutanée






Stratégie thérapeutique
antibioprophylaxie
parage minutieux de la plaie
lavage et ablation des corps
étrangers

stabilisation du squelette
(fixateur ou vissage)
réparation vasculonerveuse
réparation tendineuse
couverture cutanée
immobilisation brève
surveillance



Fracture ouverte P3
écrasement du doigt
fracture métaphyse de P3 déplacée
fracture de la matrice unguéale
décollement tablette unguéale
pas de lésion tendineuse



Stratégie thérapeutique



- ∞ Antibioprophylaxie
- ∞ Parage minutieux, lavage
- ∞ La tablette unguéale est déposée puis reposée à la fin de l'intervention
- ∞ Exploration des tendons
- ∞ Stabilisation osseuse (broches)
- ∞ Réparation de la matrice unguéale
- ∞ Reposition de la tablette unguéale



Écrasement de la main

Séquelle d'écrasement du doigt

- lésion complexe :
- Fracture base de P2
- Lésion tendineuse
- lésion cutanée
- Séquelles nécrose cutanée secondaire , en zone tendineuse et articulaire



CAT?

séquelles cutanées

- Greffe de peau total
- lambeau de Mac Grégor
- lambeau cross finger desépidermisé
- lambeau intermétacarpien homodigital
- VAC/Integra
- lambeau de Hueston



Couverture par un lambeau de HUESTON dorsal

